



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6 : A61K 38/21	A2	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/07616 (43) Date de publication internationale: 17 février 2000 (17.02.00)
<p>(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/01901</p> <p>(22) Date de dépôt international: 30 juillet 1999 (30.07.99)</p> <p>(30) Données relatives à la priorité: 98/09886 31 juillet 1998 (31.07.98) FR</p> <p>(71) Déposants (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) [FR/FR]; 101, rue de Tolbiac, F-75654 Paris Cedex 13 (FR). CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) [FR/FR]; 3, rue Michel Ange, F-75016 Paris (FR).</p> <p>(72) Inventeurs; et</p> <p>(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): KOKEN, Marcel [NL/FR]; Appartement 116, 15, allée Darius Milhaud, F-75019 Paris (FR). QUIGNON, Frédérique [FR/FR]; 6, passage Charles Dallery, F-75011 Paris (FR). DE THE, Hugues [FR/FR]; 146, rue de l'Université, F-75007 Paris (FR). AMEISEN, Jean-Claude [FR/FR]; 35 bis, rue Henri Barbusse, F-75005 Paris (FR). DE BELS, Frédérique [FR/FR]; c/o M. Bilan, 5, rue Frédéric Loliée, F-75020 Paris (FR).</p>	<p>(74) Mandataire: OBOLENSKY, Michel; Cabinet Lavoix, 2, place d'Estienne d'Orves, F-75441 Paris Cedex 09 (FR).</p> <p>(81) Etats désignés: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p>Publiée Sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport.</p>	
<p>(54) Title: USE OF NOVEL AGENTS INDUCING CELL DEATH IN SYNERGY WITH INTERFERONS</p> <p>(54) Titre: UTILISATION DE NOUVEAUX AGENTS INDUCTEURS DE MORT CELLULAIRE EN SYNERGIE AVEC LES INTERFERONS</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention concerns the use of novel agents inducing cell death, and in particular, an agent for overexpression of the PML protein on nuclear bodies, combined with interferons, to induce the death of undesirable cells and stimulate an immune reaction.</p> <p>(57) Abrégé</p> <p>La présente invention concerne l'utilisation de nouveaux agents inducteurs de mort cellulaire, et en particulier d'un agent permettant la surexpression de la protéine PML sur les corps nucléaires, en association avec des interférons, pour induire la mort de cellules indésirables et stimuler une réaction immunitaire.</p>		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

Utilisation de nouveaux agents inducteurs de mort cellulaire en synergie avec les interférons

5 La présente invention concerne l'utilisation de nouveaux agents inducteurs de mort cellulaire, et en particulier d'un agent permettant la surexpression de la protéine PML sur les corps nucléaires, en association avec des interférons, pour induire la mort de cellules indésirables.

Les corps nucléaires sont des structures associées à la matrice
10 nucléaire, de fonction inconnue, et qui contiennent un certain nombre de protéines incluant PML, Sp100, ISG20, PIC-1/SUMO-1, Iyap100, PLZF, Int-6, CBP, Rb, RFP et la protéine P ribosomale (Lamond et al, 1998). Le gène codant pour la protéine PML (pour "ProMyelocytic Leukemia") a été identifié à partir de sa fusion avec le gène *RAR α* (récepteur nucléaire de l'acide
15 rétinoïque) dans la translocation t(15;17) trouvée chez des patients atteints de leucémie promyélocytique aiguë ("Acute Promyelocytic Leukemia" - APL). Ce gène *PML* est un gène cible des interférons, et sa surexpression provoque un arrêt de la croissance de certaines lignées cellulaires (Koken et al, 1995). Dans les cellules malignes APL, la protéine PML n'est pas localisée sur les corps
20 nucléaires mais délocalisée du fait de l'expression de PML-*RAR α* . L'oxyde d'arsenic induit le retour de PML vers sa localisation normale ainsi que la mort de la cellule. Dans les cellules normales non APL, où la localisation de PML est normale, l'arsenic induit l'agrégation de PML vers de larges corps modifiés, mais le phénomène ne s'accompagne pas de mort cellulaire (Zhu et al, 1997).

25 Les auteurs de l'invention ont à présent découvert que la surexpression de la protéine PML localisée sur les corps nucléaires provoque la mort de la cellule, par un mécanisme original différent de celui de l'apoptose induite par les caspases.

La conséquence majeure de cette découverte est qu'une
30 substance favorisant l'adressage de la protéine PML vers les corps cellulaires et/ou sa stabilisation, est particulièrement utile pour induire la mort de cellules indésirables.

Lesdites substances qui induisent l'adressage de la protéine PML vers les corps nucléaires et/ou sa stabilisation, peuvent être identifiées par des tests standard connus de l'homme du métier, la mesure du transit intracellulaire entre les fractions cytoplasmique et nucléoplasmique et la fraction associée aux corps nucléaires et la stabilisation de la protéine PML pouvant être
5 notamment réalisée par Western Blot.

Lesdites cellules indésirables peuvent être notamment des cellules d'une tumeur, des cellules infectées par un virus, un parasite ou une bactérie, des cellules immunitaires participant à une réaction immunitaire inappropriée, des cellules génétiquement altérées, des cellules sénescents ou
10 hyperplasiques

Par "tumeur", on entend toute prolifération cellulaire indésirable, bénigne ou maligne, incluant notamment les cancers solides et les leucémies et lymphomes. Parmi les tumeurs malignes, on peut citer en particulier les leucémies myéloïdes chroniques et les leucémies lymphoïdes T de l'adulte
15 (ATL) et les mélanomes.

La présente invention a donc pour objet l'utilisation d'au moins une substance favorisant l'adressage de la protéine PML vers les corps nucléaires et/ou sa stabilisation pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la mort de cellules indésirables.
20

L'expression de la protéine PML étant induite par des interférons, la présence d'interférons, qu'ils soient d'origine endogène ou administrés au patient de manière simultanée ou séquentielle, est nécessaire à l'efficacité du traitement envisagé.

De manière surprenante, les auteurs de la présente invention ont plus particulièrement découvert que le zVAD (benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-méthyl)-fluorométhylcétone) d'une part stabilise la protéine PML et d'autre part accélère la mort cellulaire induite par les interférons.
25

Or, le zVAD est initialement connu comme inhibiteur des caspases, protéases impliquées dans le processus d'apoptose (Salvesen et al, 1997). Des études (McCarthy et al, 1997) ont en outre montré que le zVAD empêchait ou retardait fortement la mort cellulaire. La découverte des auteurs de la présente invention, selon laquelle le zVAD ne bloque pas la mort
30

cellulaire induite par les interférons mais au contraire l'accélère, va donc à l'encontre des résultats que pouvait attendre l'homme du métier.

La présente invention a plus particulièrement pour objet l'utilisation d'un inhibiteur et/ou substrat de caspases, tel que le zVAD, pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la mort de cellules indésirables. L'accélération de la mort cellulaire observée peut être une conséquence de la stabilisation de la PML mais peut également impliquer d'autres mécanismes, qui restent dans le cadre de la présente invention.

Par « substrat de caspases », on entend tout composé capable de se lier aux caspases.

Les auteurs de la présente invention ont également découvert que l'arsenic, et plus particulièrement le trioxyde d'arsenic, d'une part favorise l'adressage de la protéine PML vers les corps cellulaires et d'autre part accélère la mort cellulaire induite par les interférons.

La présente invention a plus particulièrement pour objet l'utilisation d'un composé de l'arsenic ou d'un composé ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la mort de cellules indésirables, en association avec au moins un interféron.

Cette induction de la mort cellulaire observée peut être une conséquence de l'adressage de la protéine PML vers les corps cellulaires, mais peut également impliquer d'autres mécanismes, qui restent dans le cadre de la présente invention.

Parmi les composés de l'arsenic, on peut citer notamment le trioxyde d'arsenic ou le mélarsoprol.

Par « composé ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic », on entend tout composé qui, comme l'arsenic, est un inhibiteur de phosphatase et/ou est capable de créer des adduits covalents par liaison avec des groupements dithiols.

Les inhibiteurs et/ou substrats de caspases ou les composés de l'arsenic ou les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic sont de préférence utilisés, pour induire la mort des cellules indésirables, en association avec la protéine PML, et/ou avec un agent

induisant la surexpression de la protéine PML. Parmi les agents induisant la surexpression de la protéine PML, on utilise de préférence un interféron, tel que l'interféron α , β ou γ .

5 En effet les auteurs de la présente invention ont plus particulièrement découvert que les substrats de caspases, et en particulier le zVAD, ainsi que les composés de l'arsenic, en particulier le trioxyde d'arsenic, agissaient de manière synergique avec les interférons pour induire et accélérer la mort cellulaire.

10 L'administration de manière simultanée ou séquentielle de PML ou d'un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tels que les interférons, peut être inutile si la quantité de PML ou d'agent induisant la surexpression de la protéine PML, tels que les interférons, d'origine endogène, est suffisante. Néanmoins, selon un mode préféré de réalisation de l'invention, l'administration d'une substance choisie parmi les composés de l'arsenic, les
15 composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases, est associée à une administration simultanée ou séquentielle de protéine PML, et/ou d'un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tels que les interférons.

20 Fait partie de l'invention l'utilisation d'une substance choisie parmi les composés de l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases, en association avec un interféron, pour induire la mort de cellules indésirables, que celle-ci soit médiée par la protéine PML induite par ledit interféron ou par un autre mécanisme également induit par ledit interféron.

25 La présente invention a également pour objet une méthode de traitement thérapeutique, dans laquelle on administre à un patient nécessitant un tel traitement une quantité thérapeutiquement efficace d'au moins une substance choisie parmi les composés de l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic et les inhibiteurs et/ou substrats
30 des caspases, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

De manière préférentielle on administre également audit patient une quantité thérapeutiquement efficace de protéine PML, et/ou d'un agent

induisant la surexpression de la protéine PML, tel qu'un interféron, de manière simultanée ou séquentielle.

La présente invention a également pour objet une composition pharmaceutique contenant

- 5 1) soit au moins un inhibiteur et/ou substrat des caspases associé à :
- au moins un composé de l'arsenic ou un composé ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic;
 - et/ou la protéine PML
 - et/ou au moins un agent induisant la surexpression de la
- 10 protéine PML, tel qu'un interféron;
- en présence d'un véhicule pharmaceutiquement acceptable ;
- 2) soit au moins un composé de l'arsenic ou un composé ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic associé à la protéine PML et/ou à au moins un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tel qu'un interféron, en
- 15 présence d'un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

La présente invention a également pour objet une composition un kit comprenant

- a) - une composition pharmaceutique (1) contenant au moins un inhibiteur et/ou substrat des caspases, en association avec un véhicule
- 20 pharmaceutiquement acceptable ;
- et/ou une composition pharmaceutique (2) contenant au moins un composé de l'arsenic ou un composé ayant les mêmes propriétés que l'arsenic, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable ; et
- b) - une composition pharmaceutique (3) contenant la protéine PML en
- 25 association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable;
- et/ou une composition pharmaceutique (4) contenant au moins un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tel qu'un interféron, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable;
- lesdites compositions pharmaceutiques étant destinées à une administration
- 30 simultanée ou séquentielle.

Le mode d'administration et la posologie dépendent de l'affection traitée et de son stade d'avancement, ainsi que du poids, de l'âge et du sexe du patient.

Conformément à l'invention, la formulation des médicaments de l'invention permet une administration notamment par voie orale, anale, nasale, intra-musculaire, intra-dermique, sous-cutanée, ou intra-veineuse.

La dose d'administration envisagée peut être par exemple de 1 à 50 mg par jour, de préférence par voie intraveineuse, pour les composés de l'arsenic, de 1 à 250 mg par kg de poids corporel de substrats de caspases tels que le zVAD, et de 1 à 20 millions d'unités internationales (M UI), de préférence de 3 à 5 M UI, de préférence par voie intra-musculaire ou sous-cutanée, par jour ou tous les deux jours, pour l'interféron.

Les auteurs de l'invention ont en outre découvert que la mort cellulaire induite par la surexpression de la protéine PML localisée sur les corps nucléaires présente des caractéristiques différentes de l'apoptose induit par les caspases. Dans le cas de la mort cellulaire induite par la PML, on n'observe en particulier pas les caractéristiques morphologiques nucléaires typiques de l'apoptose, telles que la condensation de la chromatine et la fragmentation nucléaire.

De plus, alors que la mort cellulaire induite par les interférons seuls présente les caractéristiques de l'apoptose, les auteurs de la présente invention ont observé que l'association synergique de zVAD avec les interférons fait disparaître ce phénotype apoptotique, la mort cellulaire présentant alors des caractéristiques différentes de celles de l'apoptose.

Une des conséquences majeures de cette découverte est la capacité des cellules indésirables tuées par le mécanisme induit par la PML de provoquer une réaction immunitaire contre des cellules indésirables similaires qui auraient échappé à la mort médiée par la protéine PML.

Cette propriété rend particulièrement intéressante l'utilisation d'une substance choisie parmi les composés de l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic, et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases, de préférence en combinaison avec un interféron, pour induire la mort de cellules indésirables, et/ou induire une réaction immunitaire.

Ainsi, l'administration de ces médicaments permettra une forme d'immunothérapie, ou de "vaccination", en provoquant une réaction du système

immunitaire qui élimine les cellules indésirables survivantes, qu'il s'agisse de cellules cancéreuses, de cellules infectées, ou de toute autre cellule indésirable qui participe au développement d'une maladie.

5 Cette propriété est liée au fait que ces médicaments, en particulier l'association interféron et zVAD ou le zVAD seul, entraînent dans les cellules indésirables un phénomène de mort qui ne possède pas toutes les caractéristiques de l'apoptose, qui est le phénotype physiologique le plus fréquent du suicide cellulaire.

10 En particulier, l'inhibiteur de caspases zVAD empêche l'apparition de la plupart des manifestations de l'apoptose, qui dépendent d'une activation, dans la cellule mourante, de certaines caspases. En effet, si les caspases ne sont pas indispensables à l'exécution du suicide cellulaire, elles apparaissent en revanche indispensables au cours des phénomènes de suicide cellulaire, à l'exécution d'un phénotype de mort apoptotique (Xiang J. et al. PNAS 1996, 93 : 14559 ; Quignon F. et al. Nature Genetics 1998, 20 : 259 ; Vercammen D. et
15 al, J. Exp. Med. 1998, 187 : 1477).

Un certain nombre de résultats suggèrent que la manière dont une cellule meurt joue un rôle important dans l'induction ou non d'une réaction immunitaire dirigée contre les cellules survivantes possédant les mêmes
20 caractéristiques (y compris par exemple la nature de l'anomalie qui les rend cancéreuses, ou la nature de l'agent infectieux qu'elles contiennent).

La survenue dans une cellule d'un phénomène de mort apoptotique aurait pour effet de limiter l'induction d'une réaction immunitaire contre les cellules survivantes possédant les mêmes caractéristiques, voire de
25 favoriser l'induction d'une forme de tolérance immunitaire, c'est à dire d'une inhibition sélective de l'induction d'une réponse immune dirigée contre les cellules survivantes possédant les mêmes caractéristiques. Des résultats obtenus dans certains modèles particuliers (*in vitro*, ou *in vivo* dans la chambre antérieure de l'œil de la souris), suggèrent que la mort apoptotique d'une
30 cellule pourrait d'une manière générale limiter ou inhiber l'induction des réactions d'immunité à médiation cellulaire de type hypersensibilité retardée (dites Th1) médiées par les lymphocytes T CD4+, (Griffith T. et al, Immunity 1996, 5 : 7 ; Voll R. et al, Nature 1997, 390 : 350 ; Gao Y. et al., J. Exp. Med.

1998, 188 : 887), réaction qui représente l'une des manifestations essentielles d'une réaction immune efficace contre des cellules indésirables.

Dans un modèle particulier de tumeurs chez la souris, il a été montré que la survenue dans des cellules cancéreuses de phénomènes de mort apoptotique n'entraîne pas l'induction d'une réaction immunitaire efficace dirigée contre les cellules cancéreuses vivantes présentant les mêmes caractéristiques, alors que l'introduction artificielle dans ces cellules cancéreuses d'un gène qui empêche la survenue dans les cellules mourantes d'une partie du phénotype apoptotique, permet l'induction d'une réaction immunitaire efficace dirigée contre les cellules cancéreuses vivantes présentant les mêmes caractéristiques mais dans lesquelles ce gène n'a pas été artificiellement introduit (Melcher et al, 1998, Nature Med., vol. 4, n° 5, pp 581-587).

La découverte que les médicaments décrits dans cette demande provoque la mort de cellules indésirables tout en n'entraînant pas (ou en empêchant) la survenue dans les cellules mourantes d'un phénotype apoptotique est donc importante. Elle implique que ces médicaments auront pour effet non seulement de provoquer la mort des cellules indésirables, mais aussi de permettre l'induction concomitante d'une réaction immunitaire efficace permettant l'élimination concomitante ou ultérieure des cellules indésirables qui auraient échappé à la mort induite par les médicaments.

Cette propriété peut également être mise à profit pour traiter *ex vivo* un ensemble de cellules susceptibles de contenir des cellules indésirables, avant administration à un patient, par exemple une préparation de moelle osseuse destinée à une greffe chez un patient leucémique, une telle préparation contenant généralement quelques cellules malignes résiduelles. Un tel traitement permet non seulement d'induire la mort des cellules indésirables contenues dans la préparation, mais encore de provoquer une réaction immunitaire dirigée contre les cellules indésirables présentes dans le corps du patient à qui la préparation cellulaire traitée est administrée.

La présente invention a donc également pour objet un procédé *in vitro* pour induire la mort de cellules indésirables comprenant la mise en contact de cellules indésirables avec une substance choisie parmi les

composés de l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic, et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases, ladite substance pouvant être de préférence associée à la protéine PML et/ou à un agent induisant la surexpression de la protéine PML, de préférence un interféron.

5

Les exemples et figures suivants illustrent l'invention sans en limiter la portée.

10

LEGENDE DES FIGURES

15

- La figure 1A représente l'induction de la protéine PML de 90 kD dans un clone REF(T)PML, quatre heures après exposition à des concentrations variables de ZnCl_2 .

- La figure 1B représente une analyse par FACS de cellules REF(T)PML ou de cellules contrôle, quatre heures 30 après exposition à 150 μM de ZnCl_2 . Le panneau de gauche représente le contenu en ADN par rapport à la taille des cellules. Les panneaux de droite représente le contenu en ADN en fonction de la fluorescence (TUNEL).

20

- La figure 1C représente l'analyse cytométrique des cellules REF(T)PML traitées ou non avec du ZnCl_2 , de l'étoposide, ou l'inhibiteur de caspase zVAD. Un marquage est effectué avec de l'Annexine V-FITC (panneau de gauche) ou de la Rhodamine 123 (panneau de droite). Le pourcentage en cellules apoptotiques est indiqué.

25

- La figure 2A représente l'absence de clivage de la PARP lors de la mort cellulaire déclenchée par la PML. Les cellules ont été traitées avec 150 μM de ZnCl_2 , de l'étoposide ou du zVAD.

30

- La figure 2B représente l'activité de la caspase CPP32 déterminée par coupure du DEVD-pNA dans des cellules REF(T) contrôle ou des cellules REF(T)PML. Les absorbances relatives de trois déterminations indépendantes sont présentées.

- La figure 3A montre la survie des monocytes traités avec 1000 U/ml d'IFN α . Une expérience représentative sur cinq est présentée. Les

tests TUNEL démontrent que la diminution de la numération cellulaire est due à l'épopose.

- La figure 3B représente des histogrammes indiquant l'effet du zVAD (100 μ M) 24 heures après l'addition de celui-ci. Les valeurs moyennes \pm les écarts-type de 11 expériences sont présentées.

- La figure 4A montre que le zVAD stabilise la protéine PML dans les cellules REF(T).

- La figure 4B montre que l'interféron α (1 000 U/ml) induit la PML de rat dans les cellules REF(T)PML. Les flèches indiquent des isoformes distincts de la PML.

EXEMPLES

MATERIELS ET METHODES

- Construction plasmidique

Un fragment *SacI*-*BglII* (- 69, + 55 paires de base) du promoteur de la métallothionéine de souris a été inséré dans un plasmide pKS et a été fusionné avec un fragment *BglII*-*BamHI* d'un ADNc de PML conduisant au plasmide pKSmMT-PML. Pour la fusion GFP-PML, le même fragment PML a été inséré dans le site *BglII* du vecteur pEGFP-1 (Clontech). Un vecteur rétroviral exprimant PML a été également construit par insertion d'un ADNc de pleine longueur de PML (de Thé et al, 1991) au site *EcoRI* de SR α tkneo (Muller et al, 1991).

- Culture cellulaire

Les cellules REF(T) et MEF(T) sont des fibroblastes embryonnaires de rats et de souris immortalisées par un vecteur d'expression SV40T. Les cellules REF(K1) sont immortalisées par un mutant SV40T qui ne lie pas Rb, et les cellules F111 sont des fibroblastes de rat 3T3 spontanément immortalisés. Pour des essais de clonogénicité, les cellules ont été transfectées avec 10 μ g de SR α tkneo-PML ou SR α tkneo sur des boîtes de

culture de 10 cm de diamètre et sélectionnées par de la néomycine (500 µg/ml). Pour obtenir des clones inductibles, un pool de cellules REF(T) a été co-transfecté avec le plasmide pKSmMt-PML et un vecteur de résistance à l'hygromycine (DSP-Hygro). Les colonies résistantes ont été examinées pour l'expression de la PML après quatre heures d'un traitement au ZnCl₂ (150 µM) et soumises à un deuxième cycle de clonage par dilution limite. Des clones CHO inductible ont été construits de manière similaire. Les monocytes ont été préparés selon la méthode d'Estaquier et al, 1997. L'étoposide (utilisé à 100 µM pendant 16 à 24 heures) a été obtenu auprès de Biomol Research Laboratories, le zVAD (benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp fluorométhylcétone, utilisé à 250 µg/ml) est commercialisé chez Bachem et l'IFN α de rat chez Access BioMedical. L'interféron α humain a été fourni par Schering-Plough. Les anticorps contre la protéine PML humaine sont décrits dans l'article de Daniel et al, 1993. Les expériences de Western Blot avec la protéine PML de rat endogène ont été réalisées avec l'anticorps monoclonal 5E10 qui détecte à la fois la PML de rat et la PML humaine.

Evaluation de la mort cellulaire

Les cellules ont été traitées pendant 2 heures avec 150 µM de ZnCl₂ (sauf indications contraires) en présence ou l'absence de sérum de veau foetal inactivé par la chaleur, puis les cellules ont été lavées et incubées dans un milieu sans ZnCl₂. Le test TUNEL a été réalisé selon les indications du fabricant (Boehringer Mannheim, kit de détection de la mort cellulaire *in situ*), à l'exception de l'étape de fixation (4 % de formaldéhyde dans du tampon phosphate EBS pendant 10 minutes). La teneur en ADN cellulaire a été évaluée par une incubation de 10 minutes dans de l'iodure de propidium à 50 µg/ml, en présence de Rnase A à 100 µg/ml à 4°C. L'analyse de l'expression de la phosphatidylsérine sur le feuillet externe des membranes cellulaires a été réalisée en utilisant un marquage Annexine-V-fluos (Boehringer Mannheim) et une perte de la polarité mitochondriale par Rhodamine 123 (Molecular probes) selon les instructions du fabricant. Les échantillons ont été analysés sur un analyseur FACScan (Lysis II software Becton Dickinson). Pour le clivage de substrat par les caspases, 5.10⁶ cellules ont été lavées dans du tampon PBS,

et incubées pendant une heure à 4°C dans 200 µl de tampon de lyse (10 mM Hepes, pH 7,4, 2 mM EDTA, 2 mM DTT, 0,1 % CHAPS). Après centrifugation, 20 µl de surnageant et 180 µl de tampon de réaction (100 mM Hepes, pH 7,4, 2 % de glycérol, 5 mM DTT, 0,5 mM EDTA, 50 µM DEVD-pNA (Biomol Research Laboratories)) ont été mélangés et l'absorbance à 405 nm a été mesurée après quatre heures d'incubation à 37°C. L'anticorps polyclonal SA-252 anti-PARP est commercialisé chez Biomol Research Laboratories.

EXEMPLE 1 :

La PML induit une mort cellulaire indépendante du zVAD.

La transfection d'un vecteur d'expression de la PML (pSG5-PML) dans différentes lignées cellulaires de fibroblastes a fortement diminué la formation de foyers. La protéine PML étant indétectable dans les clones obtenus à partir des cellules transfectées par la PML, ces résultats impliquent que la PML exerce un effet inhibiteur majeur soit sur le cycle cellulaire soit sur la survie des cellules. Pour comprendre le mécanisme à la base de cet effet, un pool de fibroblastes d'embryons de rat (REFs) transformés par SV40T a été transfecté avec un plasmide pKSmMT-PML, dans lequel l'expression de PML est sous le contrôle d'un promoteur de la métallothionéine de souris. Trois des clones résultant REF(T)PML ont été étudiés par la suite, tandis que trois clones REF(T) porteurs du vecteur vide ont été testés comme contrôle. La protéine PML a été détectée par Western Blot deux heures après exposition au ZnCl₂ (expression détectable à partir de 50 µM de ZnCl₂ et présentant un plateau à 150 µM de ZnCl₂) (figure 1A). L'expression de la PML a induit une mort cellulaire synchronisée de l'ensemble de la population cellulaire avec des cinétiques variant de 48 heures pour 50 µM de Zn Cl₂ à six heures pour 150 µM. Dans les trois clones REF(T)PML, des modifications morphologiques ont été observées à partir de trois heures après induction avec 150 µM de ZnCl₂. Les cellules s'arrondissent, avec un rétrécissement clair du cytoplasme (figure 1B), sont devenues positives dans un test TUNEL (figure 1B) puis se sont progressivement détachées de la boîte. Elles ont cependant gardé leur

capacité à exclure le bleu trypan. Ces modifications ont été associées avec une teneur en ADN subG1 modeste (figure 1B), une externalisation de la phosphatidylserine membranaire (figure 1C) et une perte du potentiel transmembranaire mitochondrial (figure 1C). Tandis que des modifications similaires ont été observées dans l'apoptose induite par l'agent génotoxique étoposide, elles n'ont jamais été trouvées dans les cellules contrôle REF(T) traitées avec ZnCl_2 (figures 1B et C). Contrairement au traitement par l'étoposide, la mort cellulaire induite par la PML n'est pas associée avec des caractéristiques morphologiques nucléaires typiques de l'apoptose telles que la condensation de la chromatine et la fragmentation nucléaire, même tardives dans le processus de mort cellulaire. Malgré le clivage de l'ADN (sub-G1 positif (figure 1B) et perte de la viscosité de l'ADN), la mort cellulaire induite par la PML n'est pas associée avec une échelle de l'ADN internucléosomale, en conformité avec le faible signal positif du TUNEL (figure 1B).

Contrôles :

Comme les cellules REF(T) sont des lignées cellulaires transformées par SV40T, plusieurs expériences ont été réalisées pour exclure une contribution de l'oncogène « grand T » du virus SV40 à la mort cellulaire induite par la PML. Premièrement, l'expression de la PML n'a pas altéré l'expression ou la localisation de SV40T dans les cellules REF(T)PML ni n'a dégradé la p53 ou la libération de p53 à partir de l'oncogène « grand T » du virus SV40. Deuxièmement, dans les cellules HeLa ou CHO transfectées de manière transitoire avec soit une protéine de fusion GFP-PML ou du GFP seul, toutes les cellules GFP-PML positives se sont progressivement détachées de la boîte et sont mortes, contrairement aux cellules GFP positives contrôle. Troisièmement, dans les cellules CHO transfectées de manière stable avec le plasmide pKSmMT-PML, l'induction par le ZnCl_2 a là encore conduit à la mort des clones exprimant la protéine PML. Enfin, dans les cellules REF exprimant un mutant thermosensible SV40T, la dégradation des SV40T à $39,5^\circ\text{C}$ n'a pas affecté la mort cellulaire déclenchée par la PML.

L'induction de la mort cellulaire peut requérir une transcription *de novo* ou peut refléter le déclenchement de voies préexistantes. Les cellules REF(T)PML ont été tout d'abord incubées avec ZnCl_2 et avec du cycloheximide pendant deux heures permettant ainsi la synthèse d'ARNm de PML, et non pas sa traduction. Les cellules ont ensuite été lavées et incubées avec de l'actinomycine D seule pour permettre la traduction de l'ARNm de PML mais pas la néosynthèse ARNm. Dans cette expérience, la mort cellulaire a été observée de même qu'en absence d'inhibiteur, montrant que la transcription *de novo* n'est pas requise. Une mort induite par la PML ne nécessite pas et n'induit pas la transition vers la phase S du cycle cellulaire. En effet, la PML déclenche toujours la mort dans les cellules REF(T)PML qui ont été bloquées au stade G1/S par un traitement à l'aphidicoline. De plus, une exposition au BrdU à différents temps après induction par ZnCl_2 a montré que la réplication de l'ADN n'était pas modifiée jusqu'à deux heures mais était arrêtée après trois heures et que la mort cellulaire était présente dans toutes les phases du cycle cellulaire (figure 1B).

EXEMPLE 2 :

L'arsenic favorise la mort cellulaire déclenchée par la PML.

20

Lorsque les cellules REF(T)PML ont été traitées avec du ZnCl_2 et 10^{-6} M d' As_2O_3 , une vive accélération dans les modifications morphologiques associées à la mort cellulaire a été observée. Le clivage de l'ADN déterminé par des tests TUNEL a augmenté de manière similaire (117 % de cellules positives pour le co-traitement avec ZnCl_2 contre 45 % pour ZnCl_2 seul, tandis que As_2O_3 seul n'a induit aucune augmentation par rapport au niveau de base). Le fait que l'arsenic augmente l'induction de la mort cellulaire en parallèle à la localisation de la PML sur les corps nucléaires suggère que la localisation de la PML vers les corps nucléaires est importante pour la mort cellulaire.

30

EXEMPLE 3 :

La mort déclenchée par la PML n'est pas associée à l'activation des caspases.

5 Il est connu que l'exécution de la mort cellulaire programmée implique l'activation protéolytique de caspases qui induisent les changements phénotypiques de l'apoptose par clivage de protéines nucléaires et cytoplasmiques (Salvesen et al, 1997). L'inhibiteur de caspases zVAD qui bloque l'apoptose induite par l'étoposide, n'inhibe pas la mort cellulaire
10 induite par la

PML (figure 1C) et même de manière paradoxale l'accélère (71 % de signal positif TUNEL avec du zVAD et du $ZnCl_2$ contre 45 % avec du $ZnCl_2$ seul). Ces observations impliquent que les exécutants sensibles à la zVAD ne sont pas
15 requis pour la mort cellulaire induite par la PML. De plus, la CPP32 (caspase 3), la principale caspase impliquée dans l'apoptose, apparaît ne pas être activée durant la mort cellulaire induite par la PML, dans la mesure où, un de ses substrats, la PARP (poly(ADP-ribose)polymérase) reste non clivé (figure 2A). Contrairement à l'étoposide, aucun clivage significatif des substrats de la
20 caspase colorimétrique, YVAD-pNa (caspase de classe 1, Boehringer Mannheim) et DEVD-pNA (caspase de classe 3, Boehringer Mannheim) après induction par la PML n'a pu être détecté (figure 2B).

EXEMPLE 4 :

25 L'arsenic et le zVAD potentialisent la mort cellulaire induite par la PML et les interférons.

Des monocytes primaires exposés à l'interféron α ont subi une mort cellulaire progressive qui a conduit à la disparition complète de la culture
30 cellulaire après sept jours (figures 3A et 3B). Lors de l'addition de zVAD avec l'interféron α , la mort de l'ensemble de la population cellulaire a été observée dans les 24 heures en l'absence de la fragmentation nucléaire et de la condensation de la chromatine observée avec l'interféron seul (figures 3A et

3B). Peu ou aucune mort cellulaire n'a été observée avec du zVAD seul pendant 20 jours dans la plupart des cultures primaires (8/11) (figures 3A et 3B). Dans trois cultures sur onze, le zVAD seul a induit la mort d'une partie de la culture après sept jours, ces résultats reflétant probablement une sécrétion endogène d'interféron. Des résultats similaires ont été obtenus avec d'autres inhibiteurs de caspase tel que le DEVD.

Le tableau ci-dessous représente la mort cellulaire évaluée par tunnel de cellules REF(T)PML traitées pendant deux jours avec 1 000 U/ml d'IFN α et 10⁻⁶ M d'As₂O₃ ou de zVAD.

	IFN α	
	-	+
Contrôle	5 %	42 %
zVAD	5 %	60 %
As ₂ O ₃	5,5 %	63 %

Dans les cellules REF(T), une synergie importante a été trouvée entre soit l'interféron α et le zVAD, soit l'interféron α et l'As₂O₃ (42 % de signal positif TUNEL pour l'interféron α seul, et 60 % et 63 % avec zVAD et arsenic respectivement).

Le zVAD a augmenté les niveaux d'expression de la PML (figure 4A) et l'arsenic a augmenté son association avec les corps nucléaires, alors que la quantité totale en PML a été diminuée. La similarité de la synergie du zVAD et de l'arsenic avec les morts cellulaires déclenchées par la PML et l'interféron suggère que la PML est impliquée par la mort cellulaire induite par l'interféron. De plus, l'interféron α induit la mort cellulaire avec les mêmes cinétiques que le ZnCl₂ 50 μ M et les deux induisent des quantités similaires de protéine PML (figure 4B).

REVENDICATIONS

1. Utilisation d'au moins une substance :

- 5 - qui favorise l'adressage de la protéine PML vers les corps
nucléaires et/ou sa stabilisation ; et/ou
- qui est choisie parmi les composés de l'arsenic, les composés
ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic, et les inhibiteurs et/ou
substrats des caspases ;
- 10 en combinaison avec la protéine PML et/ou à un agent induisant la
surexpression de la protéine PML ;
- pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la mort de cellules
indésirables et/ou stimuler une réaction immunitaire, l'administration de ladite
substance et l'administration de la protéine PML et/ou dudit agent induisant la
- 15 surexpression de la protéine PML étant simultanées ou séquentielles.

2. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle ladite
substance est le trioxyde d'arsenic.

20 3. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle ladite
substance est le zVAD.

 4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3
dans laquelle ledit agent induisant la surexpression de la protéine PML est un

25 interféron, tel que l'interféron α , β ou γ .

 5. Utilisation d'au moins une substance choisie parmi les
composés de l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques
que l'arsenic, et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases, en combinaison

30 avec un interféron, pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la
mort de cellules indésirables et/ou stimuler une réaction immunitaire,
l'administration de ladite substance et l'administration de l'interféron étant
simultanées ou séquentielles.

6. Procédé *in vitro* pour induire la mort de cellules indésirables comprenant la mise en contact de cellules indésirables avec une substance choisie parmi les composés de l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic, et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases,

ladite substance étant associée à la protéine PML et/ou à un agent induisant la surexpression de la protéine PML, de préférence un interféron.

7. Composition pharmaceutique contenant

1) soit au moins un inhibiteur et/ou substrat des caspases associé à :

- au moins un composé de l'arsenic ou un composé ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic;

- et/ou la protéine PML

- et/ou au moins un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tel qu'un interféron;

en présence d'un véhicule pharmaceutiquement acceptable ;

2) soit au moins un composé de l'arsenic ou un composé ayant les mêmes propriétés biologiques que l'arsenic associé à la protéine PML et/ou à au moins

un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tel qu'un interféron, en présence d'un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

8. Kit comprenant

a) - une composition pharmaceutique (1) contenant au moins un inhibiteur et/ou substrat des caspases, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable ;

- et/ou une composition pharmaceutique (2) contenant au moins un composé de l'arsenic ou un composé ayant les mêmes propriétés que l'arsenic, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable ; et

b) - une composition pharmaceutique (3) contenant la protéine PML en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable;

- et/ou une composition pharmaceutique (4) contenant au moins un agent induisant la surexpression de la protéine PML, tel qu'un interféron, en association avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable;

lesdites compositions pharmaceutiques étant destinées à une administration simultanée ou séquentielle.

9. Utilisation d'au moins une substance, autre que les composés de l'arsenic, favorisant l'adressage de la protéine PML vers les corps nucléaires et/ou sa stabilisation, pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la mort de cellules indésirables, et/ou stimuler une réaction immunitaire.

10. Utilisation d'au moins une substance choisie parmi les inhibiteurs et/ou substrats des caspases pour la fabrication d'un médicament destiné à induire la mort de cellules indésirables, et/ou stimuler une réaction immunitaire.

11. Utilisation selon la revendication 10 dans laquelle ladite substance est le zVAD.




FIG. 1A

2/7





FIG.1B

3/7

FIG. 1C







FIG.2A

5/7

FIG.2B

6/7

FIG.3AFIG.3B




FIG.4A




FIG.4B



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7 : A61K 38/21, 33/36, 38/06, 31/285	A3	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/07616 (43) Date de publication internationale: 17 février 2000 (17.02.00)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/01901 (22) Date de dépôt international: 30 juillet 1999 (30.07.99) (30) Données relatives à la priorité: 98/09886 31 juillet 1998 (31.07.98) FR (71) Déposants (pour tous les Etats désignés sauf US): INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) [FR/FR]; 101, rue de Tolbiac, F-75654 Paris Cedex 13 (FR). CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) [FR/FR]; 3, rue Michel Ange, F-75016 Paris (FR). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): KOKEN, Marcel [NL/FR]; Appartement 116, 15, allée Darius Milhaud, F-75019 Paris (FR). QUIGNON, Frédérique [FR/FR]; 6, passage Charles Dallery, F-75011 Paris (FR). DE THE, Hugues [FR/FR]; 146, rue de l'Université, F-75007 Paris (FR). AMEISEN, Jean-Claude [FR/FR]; 35 bis, rue Henri Barbusse, F-75005 Paris (FR). DE BELS, Frédéric [FR/FR]; c/o M. Bilan, 5, rue Frédéric Loliée, F-75020 Paris (FR).		(74) Mandataire: OBOLENSKY, Michel; Cabinet Lavoix, 2, place d'Estienne d'Orves, F-75441 Paris Cedex 09 (FR). (81) Etats désignés: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.</i> (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 20 avril 2000 (20.04.00)
(54) Title: USE OF NOVEL AGENTS INDUCING CELL DEATH IN SYNERGY WITH INTERFERONS (54) Titre: UTILISATION DE NOUVEAUX AGENTS INDUCTEURS DE MORT CELLULAIRE EN SYNERGIE AVEC LES INTERFERONS (57) Abstract The invention concerns the use of novel agents inducing cell death, and in particular, an agent for overexpression of the PML protein on nuclear bodies, combined with interferons, to induce the death of undesirable cells and stimulate an immune reaction. (57) Abrégé La présente invention concerne l'utilisation de nouveaux agents inducteurs de mort cellulaire, et en particulier d'un agent permettant la surexpression de la protéine PML sur les corps nucléaires, en association avec des interférons, pour induire la mort de cellules indésirables et stimuler une réaction immunitaire.		

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Bésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakhstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte Application No
PCT/FR 99/01901

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61K38/21 A61K33/36 A61K38/06 A61K31/285

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	BYRD J.C. ET AL: "Old and new therapies in chronic lymphocytic leukemia: Now is the time for a reassessment of therapeutic goals" SEMINARS IN ONCOLOGY(SEMIN. ONCOL.), 25/1 (65-74), XP002104744 United States page 71, column 1, line 15-17 ---	1
X	SOIGNET S ET AL: "Clinical and laboratory studies in leukemia of an organic arsenical, melarsoprol (Meeting abstract)." PROC ANNU MEET AM SOC CLIN ONCOL;16:A10 1997, XP002104745 the whole document --- -/--	1,2

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☐ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

15 February 2000

Date of mailing of the international search report

21/02/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Leherte, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte Application No

PCT/FR 99/01901

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KONIG ANDREA_(A) ROBERTA: "Comparative activity of melarsoprol and arsenic trioxide in chronic B-cell leukemia lines." BLOOD, 1997, XP002095650 page 568, column 2 -page 569, column 1, paragraph 1 ----	1,2
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 124, no. 23, 3 June 1996 (1996-06-03) Columbus, Ohio, US; abstract no. 307527, SLEE, ELIZABETH A. ET AL: "Benzyloxycarbonyl -Val-Ala-Asp (OMe) fluoromethylketone (Z-VAD.FMK) inhibits apoptosis by blocking the processing of CPP32--" XP002104746 abstract & BIOCHEM. J. (1996), 315(1), 21-4 CODEN: BIJOAK;ISSN: 0264-6021,1996, -----	1,3,6, 10,11

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☒ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See supplementary sheet INFORMATION FOLLOW-UP PCT/ISA/210
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

Continuation of Box I.2

Claims Nos: 1-10

Claims 1-10 of the present application concern a composition defined (inter alia) by means of the following parameters:

P1: substance promoting PML protein addressing towards bodies.

P2: substance selected among arsenic compounds, compounds having the same biological properties as arsenic, and caspase inhibitors and/or substrates.

The use of said parameters is, in the present context, considered as leading to a lack of clarity as defined by PCT Article 6. It is impossible to compare the parameters the applicant has chosen to use with what is disclosed in prior art.

The resulting lack of clarity is such that it is not possible to carry out a significant and exhaustive search. Consequently, the search was carried out on the basis of the general inventive concept of the application with particular attention to the compounds explicitly mentioned in the examples of the description on pages 12-16.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, concerning inventions in respect of which no search report has been established need not be the subject of a preliminary examination report (PCT Rule 66.1 (e)). The applicant is warned that the guideline adopted by the EPO acting in its capacity as International Preliminary Examining Authority is not to proceed with a preliminary examination of a subject matter unless a search has been carried out thereon. This position will remain unchanged, notwithstanding that the claims have or have not been modified, either after receiving the search report, or during any procedure under Chapter II.

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den
PCT/FR 99/01901

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 A61K38/21 A61K33/36 A61K38/06 A61K31/285

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	BYRD J.C. ET AL: "Old and new therapies in chronic lymphocytic leukemia: Now is the time for a reassessment of therapeutic goals" SEMINARS IN ONCOLOGY(SEMIN. ONCOL.), 25/1 (65-74), XP002104744 United States page 71, colonne 1, ligne 15-17 ---	1
X	SOIGNET S ET AL: "Clinical and laboratory studies in leukemia of an organic arsenical, melarsoprol (Meeting abstract)." PROC ANNU MEET AM SOC CLIN ONCOL;16:A10 1997, XP002104745 le document en entier --- -/--	1,2

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☐ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

15 février 2000

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

21/02/2000

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Leherte, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den
PCT/FR 99/01901

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie	Identification des documents cités. avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	KONIG ANDREA_(A) ROBERTA: "Comparative activity of melarsoprol and arsenic trioxide in chronic B-cell leukemia lines." BLOOD, 1997, XP002095650 page 568, colonne 2 -page 569, colonne 1, alinéa 1 ---	1,2
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 124, no. 23, 3 juin 1996 (1996-06-03) Columbus, Ohio, US; abstract no. 307527, SLEE, ELIZABETH A. ET AL: "Benzyloxycarbonyl -Val-Ala-Asp (OMe) fluoromethylketone (Z-VAD.FMK) inhibits apoptosis by blocking the processing of CPP32--" XP002104746 abrégé & BIOCHEM. J. (1996), 315(1), 21-4 CODEN: BIJOAK; ISSN: 0264-6021, 1996, -----	1,3,6, 10,11

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

La demande internationale n°

PCT/FR 99/01901

Cadre I Observations – lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (suite du point 1 de la première feuille)

Conformément à l'article 17.2(a), certaines revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche pour les motifs suivants:

1. ☐ Les revendications n^{os} se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche, à savoir:

2. ☒ Les revendications n^{os} se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier:
voir feuille supplémentaire SUITE DES RENSEIGNEMENTS PCT/ISA/210

3. ☐ Les revendications n^{os} sont des revendications dépendantes et ne sont pas rédigées conformément aux dispositions de la deuxième et de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

Cadre II Observations – lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 2 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

1. ☐ Comme toutes les taxes additionnelles ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.

2. ☐ Comme toutes les recherches portant sur les revendications qui s'y prêtaient ont pu être effectuées sans effort particulier justifiant une taxe additionnelle, l'administration n'a sollicité le paiement d'aucune taxe de cette nature.

3. ☐ Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les revendications n^{os}

4. ☐ Aucune taxe additionnelle demandée n'a été payée dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte par les revendications n^{os}

Remarque quant à la réserve

- ☐ Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant.
- ☐ Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDICUES SUR PCT/SA/ 210

Suite du cadre I.2

Revendications nos.: 1-10

Les revendications 1-10 présentes ont trait à une composition définie (entre autres) au moyen des paramètres suivants:

P1: Substance qui favorise l'adressage de la protéine PML vers les corps

P2: Substance choisie parmi les composés de

l'arsenic, les composés ayant les mêmes propriétés biologiques que

l'arsenic, et les inhibiteurs et/ou substrats des caspases.

L'utilisation de ces paramètres est considérée, dans le présent contexte, comme menant à un manque de clarté au sens de l'Article 6 PCT.

Il est impossible de comparer les paramètres que le déposant a choisi d'utiliser avec ce qui est révélé dans l'état de la technique. Le manque de clarté qui en découle est tel qu'une recherche significative complète est impossible. Par conséquent, la recherche a été effectuée selon l'idée inventive générale de la demande et a surtout été concentrée sur les composés mentionnés explicitement dans les exemples de la description aux pages 12-16.

L'attention du déposant est attirée sur le fait que les revendications, ou des parties de revendications, ayant trait aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche n'a été établi ne peuvent faire obligatoirement l'objet d'un rapport préliminaire d'examen (Règle 66.1(e) PCT). Le déposant est averti que la ligne de conduite adoptée par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international est, normalement, de ne pas procéder à un examen préliminaire sur un sujet n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. Cette attitude restera inchangée, indépendamment du fait que les revendications aient ou n'aient pas été modifiées, soit après la réception du rapport de recherche, soit pendant une quelconque procédure sous le Chapitre II.